

SARAMPIÓN

Actualización de Avisos preventivos

Marzo 2018

Epidemiología de Sarampión en Europa



Endémicos:

Bélgica

Francia

Alemania

*Italia

Polonia

* Rumanía

*Ucrania 72%

1/02/17 al 31/01/18:

29 Países de UE

14,732 casos

31 defunciones

2018:

15 países: 1,073 casos

Panorama Sarampión: América




2014: EU: 667

2015: 614 (369 i)
Brasil: 214
EU: 189
Canadá: 196
Chile: 9
Perú: 4
Colombia México

2016: 78
EU: 70
Canadá: 7
Ecuador: 1

2017: 599 (11301)
Rep BV: 431
EU: 120 B3D8
Canadá: 45 B3D8
Ecuador: 1
Argentina: 3 D8

Panorama Sarampión: América 2018




2018:

| | |
|--------------------|-----|
| Guatemala: | 1 |
| Antigua y Barbuda: | 1 |
| Brasil: | 14 |
| Canadá: | 4 |
| Colombia: | 1 |
| EU: | 13 |
| México: | 4 |
| Perú: | 2 |
| Venezuela: | 159 |

Fuentes: Reportes de vigilancia enviados a la Unidad de Inmunizaciones de la OPS/OMS y por el Ministerio de Salud de Venezuela.


*Datos hasta la semana epidemiológica (SE) 11 de 2018

Incidencia Sarampión: México 1990-2018



1995: No defunciones

2011: Todos importados o asociados a importación



2018: 4

1 vacunado, 1 no vacunado, 2 desconocido

Guasave Sin. Extranjero con serología positiva prob.

Índice de riesgo por acumulo de susceptibles en SLP Menores de 5 años




San Luis Potosi

- 2013: 9,227
- 2014: 3,464
- 2015: 2,994
- 2016: 2,421
- 2017: 10,307

$$\text{IR: } \frac{28,413}{49,102} = 0.57$$


| IR | RIESGO |
|-------------|--------|
| ≤ 0.49 | BAJO |
| 0.5 - 0.79 | MEDIO |
| > 0.8 | ALTO |

V. E. EFE San Luis Potosí, 2018




V. E. EFE San Luis Potosí

Casos e incidencia de EFE, San Luis Potosí, 2007-2017



Casos de EFE por institución, SLP, 2018*



V. E. EFE San Luis Potosí.

Población con mayor riesgo de contraer la enfermedad:

- Viajeros internacionales sin antecedente de vacunación.
- Menores de 1 año que sean llevados a viajes internacionales.
- Contactos de casos confirmados sin antecedentes de vacunación
- Trabajadores de consulados, embajadas o que tengan contacto con extranjeros y no aseguren su antecedente de vacunación.

V. E. EFE San Luis Potosí.

Amenazas:

- Importación constante de virus de sarampión desde otras regiones del mundo
- Casos sospechosos de Zika, rubeola, etc. enmascaran casos sospechosos de SR por tener clínica similar
- Disminución de la inmunidad en <1 año sin transferencia de anticuerpos maternos y niños <6 meses que no son elegibles para vacunación
- Falta de biológicos para protección de la población
- Coberturas de vacunación sectorial por debajo del 95 % en el ultimo año, con acumulo de susceptibles

Compromisos:

Mantener capacitado al personal de salud en la Vigilancia Epidemiológica de EFE.

Garantizar la notificación inmediata de casos y la calidad de la muestra.

Fortalecer la coordinación intersectorial para el abordaje de los casos de EFE.

V. E. EFE San Luis Potosí.

Recomendaciones

Antes de su viaje:

Aplicar la vacuna contra el sarampión (un mínimo de 14 días antes de su viaje), si no puede demostrar que fue vacunada previamente.

Los niños de 6 a 11 meses de edad deben tener una dosis de vacuna contra el sarampión, si se viaja internacionalmente y revacunarse al cumplir el 1er año e.

Las mujeres en edad fértil deberán vacunarse con SR

La vacuna SR se deberá aplicar cuando haya casos de sarampión en una región, a partir de los seis meses de edad sin que esta dosis forme parte del esquema de vacunación.

Durante su viaje y a su regreso:

Si presenta fiebre y exantema durante su viaje y hasta después de 21 días de su regreso a México:

- No se auto-medique y busque atención médica de inmediato.
- Tome abundantes líquidos, vida suero oral o electrolitos orales para prevenir la deshidratación.
- Comente con el personal médico sobre su antecedente de viaje
- Evite el contacto con otras personas durante cuatro días pos exantema
- Si está enfermo a su regreso a México, avise al asistente de vuelo antes de aterrizar o al oficial de Sanidad Internacional cuando salga del avión.

V. E. EFE San Luis Potosí.

Recomendaciones

Durante su estancia o tránsito en esos países:

- Lávese las manos con frecuencia ó desinfecte sus manos con solución alcoholada en gel para manos (60 % -OH).
- Procure no tocar sus ojos, nariz o boca o asegúrese manos limpias.
- Cubrase la boca y nariz al toser o estornudar (pañuelo, manga, co)
- Evite el contacto cercano, como besos, abrazos o compartir cubiertos o vasos, con personas enfermas.
- Obtenga los teléfonos, dirección del consulado de México más cercano, para contactarlo en caso necesario.

Recomendaciones en el hogar:

El virus persiste hasta dos horas en el ambiente y superficies.

- Ventilar los ambientes de la casa con frecuencia.
- Desinfectar los pisos y otras superficies con una solución de cloro 50 ml por cada litro de agua.
- Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.
- Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.
- Si presenta síntomas no asistir a lugares concurridos, todos los convivientes deben consultar al médico para ver si están protegidos.

V. E. EFE San Luis Potosí.

Recomendaciones

Personal de Salud:

Estar atentos a los casos de EFE, realizar el EE con atención a antecedente de viaje, eventos masivos, contacto con extranjeros o casos similares en los 28 días previos

Notificación inmediata de casos a los epidemiólogos y asegurar la toma de muestra (EF Hank's)

Recomendar que los casos de EFE eviten asistencia a lugares concurridos hasta 5 días después de la aparición del exantema.

De confirmarse el caso se realizara bloqueo vacunal, cerco epidemiológico y seguimiento diario a los contactos identificados

Conclusiones

- *Se debe incrementar la vigilancia en todo el Estado y por todas las Instituciones.*
- *Asegurar que el personal de salud identifique riesgos y aplique medidas de prevención.*
- *Fundamental: Difusión de información correcta y oportuna.*
- *No tenemos una situación de contingencia, sin embargo debemos estar alertas ante la posible presencia de casos importados.*
- *Mantener al personal de salud capacitado, informado y actualizarlo sobre el panorama.*